

Aronia ×prunifolia 'Viking'

Planttype: Heester

Nederlandse naam:

Appelbes

familie:

Rosaceae

synoniem:

Aronia floribunda 'Viking'

winterhardheid:

zeer goed (a) (-29 tot -26 °C), USDA zone 5a



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	wit
bloeitijd:	mei
hoogte:	120-150 cm
groeiwijze:	breed opgaand
blad/loof:	bladverliezend, groen, in de herfst roodpaars met geel
vrucht:	zwart, eetbaar
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Wanneer: mei-Juni, na de bloei

Wat: Direkt na de bloei de uitgebloeide takken terugknippen tot op sterke nieuwe scheuten. Ook enkele oude takken kort terugsnijden tot op 10 cm boven de grond. Hierdoor wordt de struik voortdurend verjongd.

Corylus 'Halle'sche Riesen'

Planttype: Fruit boom

Nederlandse naam:

Hazelaar

Hazelnoot

familie:

Betulaceae

synoniem:

Corylus 'Géant de Halle'

Corylus avellana 'Halle'sche Riesen'

winterhardheid:

zeer goed (a) (-29 tot -26 °C), USDA zone 5a

kenmerken

bloemkleur:	geel, redelijk zelfbestuivend,
bloeitijd:	tamelijk vroeg, middentijds
hoogte:	200 cm
vrucht:	bruin
rijptijd:	begin september midden september
smaak:	flauwzoet, aparte smaak
grondsoort:	Alle, normaal
vochtigheid:	normaal
licht:	half schaduw, zon
standplaats:	beschut

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: Een aantal oude takken (maximaal 1/3 van alle takken) verwijderen tot op 10 cm boven de grond. De oude takken zijn te herkennen aan de lichtere kleur hout. Door deze snoeiwijze ontwikkelt de plant regelmatig krachtige nieuwe scheuten. Door deze snoeiwijze blijven er ook voldoende takken over die zorgen voor de bloei.

Diospyros kaki sharon

Planttype: Fruit boom)

Nederlandse naam:

Kaki

Sharonfruit

Dadelpruim

Japanse persimmon

familie:

Ebenaceae

herkomst:

Himalaya, Korea, Japan

winterhardheid:

matig (b)(-9 tot -7 °C), USDA zone 8b




foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	zachtgeel
bloeivorm:	klokvormig, tweehuizig
bloeitijd:	juni
hoogte:	400-600 cm
groeiwijze:	breed opgaand, grillige takken
blad/loof:	bladverliezend, groen
vrucht:	oranje, 5-7 cm, opvallend
rijptijd:	september-oktober
smaak:	zoet bij volledige rijpheid
grondsoort:	voedzame, goed doorlatende, leemachtige grond
licht:	lieft volle zon

De kakiboom vormt redelijk grote, oranje vruchten.

snoei/verzorging

Wanneer: December-Januari

Wat: Kruisende takken of takken die in de weg zitten terugknippen

Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu'

Planttype: Heester

Nederlandse naam:
Althaeastruik

familie:
Malvaceae

synoniem:
Hibiscus syriacus 'Blue Bird'

winterhardheid:
goed (b) (-20 tot -18 °C), USDA zone 6b



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	helderlilablauw met donker oog
bloeivorm:	groot, enkelbloemig
bloeitijd:	augustus-september
hoogte:	180-200 cm
groeiwijze:	opgaand tot bolvormig
blad/loof:	bladverliezend, lichtgroen, laat uitlopend
snoei:	kan in het vroege voorjaar sterk gesnoeid worden
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	lieft volle zon, eventueel halfschaduw
standplaats:	beschut tegen harde wind

snoei/verzorging

Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.

Hippophae rhamnoides 'Leikora'

Planttype: Heester

Nederlandse naam:

Vrouwelijke duindoorn

familie:

Elaeagnaceae

winner:

H.J. Albrecht, Berlijn, Duitsland, 1979

winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4

kenmerken

bloemkleur:	geelgroen
bloeitijd:	april-mei
hoogte:	250-300 cm
groeiwijze:	breed opgaand
blad/loof:	bladverliezend, grijsgroen
takken/bast:	bezet met doornen
vrucht:	oranje, eetbaar, hoog vitamine-C gehalte
rijptijd:	september-oktober
grondsoort:	zanderig, lichtzuur, weinig vruchtbaar
vochtigheid:	kan goed tegen droogte
licht:	zon tot halfschaduw
standplaats:	bestand tegen zoute zeelucht

Dit is een vrouwelijke selectie van de in het wild voorkomende duindoorn. De plant is tweehuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op aparte planten) en voor vruchten zijn dan ook 2 planten nodig.

snoei/verzorging

Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.

Hippophae rhamnoides 'Pollmix'

Planttype: Heester

Nederlandse naam:

Mannelijke duindoorn

familie:

Elaeagnaceae

winner:

H.J. Albrecht, Berlijn, Duitsland, 1986

winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29 °C), USDA zone 4



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.nl)

kenmerken

bloemkleur:	geelgroen
bloeitijd:	april-mei
hoogte:	180-250 cm
groeiwijze:	opgaand
blad/loof:	bladverliezend, grijsgroen tot groen
vrucht:	vormt geen vruchten (mannelijke plant)
grondsoort:	zanderig, lichtzuur, weinig vruchtbaar
vochtigheid:	kan goed tegen droogte
licht:	zon tot halfschaduw
standplaats:	bestand tegen zoute zeewind

Er is een 'Pollmix 1' en 'Pollmix 3'. De eerste bloeit een aantal dagen eerder.

snoei/verzorging

Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.

Malus domestica 'Brabantsche Bellefleur'

Planttype: Fruit boom

Nederlandse naam:

Handappel

familie:

Rosaceae

herkomst:

?Nederland

synoniem:

Malus domestica 'Zure Bellefleur'

winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6

nachtvorstschade:

het vruchtbeginsel licht gevoelig



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.nl)

kenmerken

bloemkleur:	wit, in knop roze
bloeivorm:	redelijk zelfbestuivend
bloeitijd:	april
hoogte:	300-500 cm
groeiwijze:	opgaand, later een brede, dichte kroon
blad/loof:	bladverliezend, groen
vrucht:	geelgroen met een rode blos aan de zonzijde
rijptijd:	begin tot half oktober, eetrijp vanaf half november
smaak:	stevig wit vruchtvlees, aangenaam aromatisch en zoetzuur
gebruik:	handappel, maar ook voor moes en in de bakkerij
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	lieft volle zon

Dit oude ras kan zowel als handappel gebruikt worden als voor moes of gebak. Vooral geschikt als hoogstamboom.

snoei/verzorging

Algemeen:

Pitvruchten kunt u snoeien zolang er geen bladeren aan de boom zitten, ook tijdens de winter kunt u gewoon snoeien

Veel en sterk snoeien van de bomen geeft altijd een (te) sterke groeireactie. Bij veel groei komt de vruchtknopzetting sterk in gevaar

als de boom op hoogte is, niet meer in de kop snoeien

Gebruik goed en scherp gereedschap

wonden groter dan 2 cm behandelen met een wondafdekmiddel

Het eerste jaar, tijdens of direct na het planten wordt de koptak voor 1/3 teruggesnoeid en meestal de drie zijtakken (gesteltakken). Dit gebeurt omdat de boom nog moet groeien en zich moet vormen. Het volgende jaar worden de takken die gegroeid zijn op de insnoeiplaatsen weer voor 1/3 ingesnoeid. Dit blijft u herhalen tot dat de boom de gewenste grootte heeft bereikt. Daarna snoeit u de koptak en de gesteltakken niet meer in en stopt de hoogte-en

Prunus domestica 'Opal'

Planttype: Fruit boom

Nederlandse naam:

Pruim

familie:

Rosaceae

winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6

nachtvorstschade:

het vruchtbeginsel licht gevoelig

kenmerken

bloemkleur:	wit
bloeitijd:	midentijds
hoogte:	300-400 cm
vrucht:	paarsrood, gele ondergrond
rijptijd:	eind juli, begin augustus
smaak:	saprijk, zoet, aangenaam aroma
grondsoort:	Alle, lichte klei
vochtigheid:	normaal
licht:	zon
standplaats:	beschut
bijzonderheden:	zeer goede pruim

snoei/verzorging

Algemeen:

steenvruchten worden gesnoeid direct na de oogst, dit i.v.m. ziektes

veel en sterk snoeien van de bomen geeft altijd een (te) sterke groeireactie. Bij veel groei komt de vruchtknopzetting sterk in gevaar

als de boom op hoogte is, niet meer in de kop snoeien

gebruik goed en scherp gereedschap

wonden groter dan 2 cm behandelen met een wondafdekmiddel

Steenvruchten worden nooit sterk gesnoeid. In de zomer mag u dood hout verwijderen. Na de oogst kunnen steenvruchten worden gesnoeid. Takken die elkaar kruisen, verwijderen. Lange eenjarige takken (vooral bij pruimen) nooit half doormidden knippen want dan krijgt u veel groei in de boom en dat moet voorkomen worden. Daarom lange scheuten laten staan om vruchthout te laten worden of geheel verwijderen als de boom te groot wordt. Grote wonden behandelen. Wees altijd voorzichtig met het snoeien van steenvruchten.

Advies: de eerste vijf jaar niet snoeien.

Prunus dulcis 'Robijn'

Planttype: Fruit boom

Nederlandse naam:

Amandel

familie:

Rosaceae

winterhardheid:

redelijk (a) (-18 tot -15°C), USDA zone 7a

nachtvorstschade:

het vruchtbeginsel licht gevoelig



foto gemaakt door: Fruitpark, Ochten

kenmerken

bloemkleur:	roze, goed zelfbestuivend
bloeitijd:	vroeg
hoogte:	250-300 cm
vrucht:	bruin
rijptijd:	begin september midden september
smaak:	zoet, aparte smaak
grondsoort:	normaal, zanderig
vochtigheid:	normaal
licht:	zon
standplaats:	beschut
bijzonderheden:	zeer vroege bloei

snoei/verzorging

Algemeen:

steenvruchten worden gesnoeid direct na de oogst, dit i.v.m. ziektes

veel en sterk snoeien van de bomen geeft altijd een (te) sterke groeireactie. Bij veel groei komt de vruchtknopzetting sterk in gevaar

als de boom op hoogte is, niet meer in de kop snoeien

gebruik goed en scherp gereedschap

wonden groter dan 2 cm behandelen met een wondafdekmiddel

Steenvruchten worden nooit sterk gesnoeid. In de zomer mag u dood hout verwijderen. Na de oogst kunnen steenvruchten worden gesnoeid. Takken die elkaar kruisen, verwijderen. Lange eenjarige takken (vooral bij pruimen) nooit half doormidden knippen want dan krijgt u veel groei in de boom en dat moet voorkomen worden. Daarom lange scheuten laten staan om vruchthout te laten worden of geheel verwijderen als de boom te groot wordt. Grote wonden behandelen. Wees altijd voorzichtig met het snoeien van steenvruchten.

Advies: de eerste vijf jaar niet snoeien.

Pyrus communis 'Condo'

Planttype: Fruit boom

Nederlandse naam:

Handpeer

familie:

Rosaceae

winterhardheid:

goed (-23 tot -18 °C), USDA zone 6

nachtvorstschade:

het vruchtbeginsel licht gevoelig



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	wit, zelfbestuivend
bloeitijd:	april
hoogte:	300 cm
groeijijze:	strak opgaand
blad/loof:	bladverliezend, groen
vrucht:	gelig groen
rijptijd:	september
smaak:	zoet
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	lieft volle zon
standplaats:	beschut

De peer Condo groeit met vrij steile takken. Met iets snoeien is hier een zuilboom van te maken.

snoei/verzorging

Algemeen:

Pitvruchten kunt u snoeien zolang er geen bladeren aan de boom zitten, ook tijdens de winter kunt u gewoon snoeien

Veel en sterk snoeien van de bomen geeft altijd een (te) sterke groeireactie. Bij veel groei komt de vruchtknopzetting sterk in gevaar

als de boom op hoogte is, niet meer in de kop snoeien

Gebruik goed en scherp gereedschap

wonden groter dan 2 cm behandelen met een wondafdekmiddel

Het eerste jaar, tijdens of direct na het planten wordt de koptak voor 1/3 teruggesnoeid en meestal de drie zijtakken (gesteltakken). Dit gebeurt omdat de boom nog moet groeien en zich moet vormen. Het volgende jaar worden de takken die gegroeid zijn op de insnoeiplaatsen weer voor 1/3 ingesnoeid. Dit blijft u herhalen tot dat de boom de gewenste grootte heeft bereikt. Daarna snoeit u de koptak en de gesteltakken niet meer in en stopt de hoogte- en breedtegroei vanzelf. Door het insnoeien van de koptak en de gesteltakken komen er kleine

Ribes rubrum 'Rovada'

Planttype: Fruit boom

Nederlandse naam:

Rode bes

Aalbes

Bes, rode

familie:

Grossulariaceae



foto gemaakt door: Pixabay

kenmerken

bloemkleur:	geel, goed zelfbestuivend
bloeitijd:	middentijds
hoogte:	150-200 cm
blad/loof:	bladverliezend, groen
vrucht:	rood
rijptijd:	eind juli, begin augustus
smaak:	saprijk, zuur, zacht vruchtvlees
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Na het planten worden de takken voor 1/3 ingesnoeid. In de zomer de nieuwe scheuten die uit de grond komen verwijderen.

In de winter worden de zijscheuten teruggesnoeid op 5 cm. Zware zijscheuten geheel verwijderen. De top alleen insnoeien als de plant hoger moet worden, anders deze niet insnoeien.

In de tweede zomer de scheuten die uit de grond komen verwijderen. De mooiste vrucht-trossen komen aan kort vruchthout.

Bij oude struiken kan soms een gehele tak verwijderd worden, waarbij deze vervangen wordt door een nieuwe grondscheut.

Ribes uva-crispa Hinnonmäki Röd (= 'Hinnonmäen Punainen')

Planttype: Fruit(boom)

Nederlandse naam:

Klapbes

Kruisbes

Stekelbes

familie:

Grossulariaceae

synoniem:

Ribes uva-crispa 'Hinnonmäen Punainen' (HINNONMÄKI RÖD)

winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	zachtgeel
bloeitijd:	april-mei
hoogte:	80-100 cm
breedte:	100 cm
groeiwijze:	breed opgaand
blad/loof:	bladverliezend, groen
takken/bast:	bezet met veel stekels
vrucht:	middelgrote donkerrode bessen
rijptijd:	eind juni-half juli
smaak:	saprijk en zoet
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

Zelfbestuivend. Is goed resistent tegen meeldauw.

snoei/verzorging

Na het planten worden de takken voor 1/3 ingesnoeid.

De vruchten groeien aan éénjarig en kort vruchthout. Daarom is het noodzakelijk om oud en gedragen takken te verwijderen zodat er nieuw éénjarig hout ontstaat.

Overtollige grondscheuten ook verwijderen, zorg dat de struik open blijft.

Rubus idaeus 'Autumn Bliss'

Planttype: Fruit boom

Nederlandse naam:
Herfstframboos

familie:
Rosaceae

winterhardheid:
zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	wit
bloeitijd:	juli-augustus
hoogte:	150-180 cm
groeiwijze:	opgaand, slappe takken die aangebonden moeten worden
blad/loof:	bladverliezend, groen
vrucht:	rood, sappig
rijptijd:	augustus-september
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Herfstframbozen dragen op éénjarige scheuten

Na het planten de bestaande scheut insnoeien tot 30 cm boven de grond.

In de loop van het voorjaar komen er nieuwe scheuten uit de grond, deze aanbinden aan de draden.

Maximaal 2 scheuten per plant aanhouden, de overige scheuten verwijderen.

Deze scheuten zullen in de herfst vrucht dragen. Na de oogst worden deze scheuten teruggesnoeid tot 30 cm boven de grond, in het volgende voorjaar komen er weer nieuwe scheuten.

Sambucus nigra Black Lace (= 'Eva')

Planttype: Heester

Nederlandse naam:
Roodbladige vlier

familie:
Adoxaceae

winner:
East Malling Research, Kent, Engeland

synoniem:
Sambucus nigra 'Eva' (BLACK LACE)

winterhardheid:
zeer goed (-29 tot -23 °C), USDA zone 5



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	lichtroze, in knop roze
bloeitijd:	mei-juni
hoogte:	200-300 cm
groeiwijze:	fors opgaand
blad/loof:	bladverliezend, donker purperbruin, fijn gedeeld
vrucht:	zwart
grondsoort:	elke grondsoort
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.